

Sessão 2
PATOLOGIA, PARASITOLOGIA E REPRODUÇÃO

016

PREVALÊNCIA DE TRYPANOSOMA CRUZI EM SOROS DE CÃES NO HOSPITAL DE CLÍNICA VETERINÁRIA DE PORTO ALEGRE, R.S. *Luciane Dubina Pinto, Mayra Seilbert, Neilton Rogério S. Silva, Flávio A. P. Araújo., Eunice Leonora Chaplin.* (Departamento de Patologia Clínica Veterinária, Faculdade de Veterinária, UFRGS).

Foram Processados cento e vinte amostras de soro de cães com até um ano de idade, trazidos ao Hospital de Clínica Veterinária para consulta. O sangue foi colhido da veia cefálica com seringa descartável, colocado em tubo de vidro e deixado em repouso em temperatura ambiente para coagular. O soro removido e congelado a -20 C até o momento do teste sorológico. A técnica desenvolvida foi a de hemoaglutinação indireta, utilizando-se antígenos comerciais. Utilizou-se apenas na titulação de 1:64. Todos os soros testados foram negativos, reagindo apenas no soro teste positivo. A condição de resultado negativo para Trypanosoma cruzi, em cães jovens é um indicador da difusão do agente no meio ambiente e do baixo potencial de risco ao ser humano. (PROPESP, CNPq E CAPES).