

A tireoidite pós-parto (TPP) é definida como a alteração da função tireoideana que ocorre no período pós-parto e com provável etiologia auto-imune.. Avaliamos a prevalência de TPP nas mulheres que traziam seus filhos para consultar no ambulatório de pediatria do HCPA., dividindo-as em três cortes transversais, pela idade do bebe (30-90 dias; 91-150 dias e 151-210 dias) e obtivemos os seguintes resultados: o primeiro corte, com 100 integrantes, apresentou 4 com hipotireoidismo subclínico e 2 com alterações de anticorpos anti-tireóide; o segundo com 63 integrantes apresentou 1 com hipertireoidismo franco, 2 com hipertireoidismo subclínico e 7 pacientes com anticorpos anti-tireóide e o último corte com 59 integrantes apresentou 1 com hipertireoidismo franco e 2 com hipertireoidismo subclínico; o que nos dá uma prevalência de 6%, 15% e 5%, respectivamente.. Foram avaliados ainda fatores de risco para o desenvolvimento de TPP (idade materna, paridade, fumo, sexo do bebe, fumo uso de anticoncepcional oral, história familiar e pessoal de tireoidopatia, amamentação e abortamentos) e correlacionadas sinais e sintomas com disfunção tireoideia, sem alterações significativas, porém deve-se mencionar que nosso final ainda não está completo.