

**TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL COMO PARTE DO TRATAMENTO PERIODONTAL DE PACIENTE USUÁRIO DE NIFEDIPINA: RELATO DE CASO.**

Brião DV\*, Daudt FARL, Valandro L

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O objetivo do presente trabalho é apresentar um relato clínico de um paciente com gengivite e periodontite associada à utilização de medicamento bloqueador dos canais de cálcio e com aumento de volume gengival. O caso apresentado trata de um paciente do sexo masculino de 59 anos usuário de nifedipina a 12 anos, para controle da pressão arterial, que apresentava aumento de volume gengival associada a biofilme, e relatava dificuldade de higienização bucal devido ao aumento do tecido gengival. A abordagem realizada foi raspagem, alisamento e polimento supragengival (realizado com ultrassom) e instrução de higiene bucal. Após o controle de placa supragengival foi realizado o tratamento da periodontite (raspagem subgengival) seguidos de gengivectomia e, possibilitando assim a manutenção da higiene pelo paciente. O paciente foi encaminhado para reabilitação protética e mantém-se em manutenção periodontal. Conclui-se que mesmo que o uso de bloqueadores dos canais de cálcio possibilite o surgimento de aumento de volume gengival, este quadro somente se apresenta na presença de biofilme. Portanto, e de extrema importância que o tratamento de pacientes com tal quadro clínico possibilite a manutenção de uma adequada higiene bucal pelo paciente, com o intuito de manter sua saúde bucal e evitar a progressão da hiperplasia inflamatória.

Descritores: betabloqueador dos canais de cálcio, hiperplasia gengival, gengivectomia