

AN41. T Sr DOS R USI STR OS H ISTOPATOLOG I CO;'. R ENA EM
 CINCO -CONSIDERACOES CGORE 925 CASOS DE
 PUNÇÃO DiárCIA J.Vet torazz i ,J.S.Bande i ra ,C
 Ureitag,L .K.Amakawa , S.Spadini ,J.Morales e M.I.
 I we v o de Ne Frolog í a do HCPA)

O estudo do teci do renal pela punção b i a renal (POR)t em
 s ido de ,iirande ut i l i dade no correto d iagnóst i co e tratamen-
 to das patolog i as rena i s.Ust e estudo anal isa a adequação da
 Amostra,obt i da por POR ,para o estudo Ti i st opatol dg i co,bem co
 mn,as pr inc i {i i:1 i s patolog i as d l agnost l cadas nos estudos h i s-
 topatol6g cos real i zados no HCPA entre set „de í 986 e ago.de
 l 991 .roram est udados 53000 exames anát.(mm)-pat (i)1(i)g e 1520
 (3%) Foram patolog i as rena i s que Foram' dividi dos em POR com
 925 casost61%) i óps i as em transplante renal com 22% dos ca
 sos e ne Frect om i as(17%). As POR Foram posl t l vas e adequadas
)5glomáruicsipara o d i agniist i co em 77i casos sendo obt i do
 o d i agn(ist l co de Pin it i vo em 7i4 casos (92,6Z) Predom inaram
 as g l omerul opat i as .Send.o que pr l már i as foram 72% do t (:3 t: a l
 de•t pr eVal acendo a gl omerUi oesclerose segmentar e 'ocal
 (40.5%)e a g l omerulone Fri te membranosa(í2.4Z) .0 lupus er
 si co roi a causa de 74.2% ,das glomerulopat i as
 secundár • as .A inric i a das vár i as patolog i as é semelhante
 a •ncontrada na l i teratura.A part i r destes resultados can-
 elui• se que apesar da tecnõlog i a cl i spon , somente em
 77.3% da POR raal l zadas é poss ivel chegar ao d i agnóst ico
 f i l'lal def init i vo, dados que são semelhantes aos encontrados
 outros centros que real i zam POR .