ORIENTAÇÃO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE SERVIÇOS UTILIZADOS POR PESSOAS IDOS DE PORTO ALEGRE, RS.

Martins AB*, Dotto JM, D'Avila OP, Neves M, Hilgert JB, Hugo FN

Introdução: A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, de 2006, define que a atenção à saúde dessa população terá como porta de entrada a Atenção Primária à Saúde (APS), que é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos atributos de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Desta forma, aumenta a necessidade de avaliar as respostas que o sistema de saúde vem dando as questões relacionadas com a saúde da pessoa idosa e a capacidade que o mesmo possui de orientar sua atenção considerando os atributos essenciais à sua qualidade. Objetivo: Descrever a orientação dos serviços acessados pelos idosos, de acordo com o escore correspondente a soma dos atributos essenciais da atenção primária a saúde através do instrumento PCATool-Brasil (Instrumento de Avaliação da APS). Método: Neste estudo de delineamento transversal, foram entrevistados 804 idosos, selecionados através de uma amostra aleatória por conglomerados nosdistritos sanitários Partenon e Lomba do Pinheiro em Porto Alegre. Foram realizadas entrevistas por meio de um questionário sociodemográfico, além do instrumento PCATool-Brasil. Foi realizada análise descritiva das variáveis e dos escore essencial dos atributos de APS. Serviços de saúde com escores maiores ou iguais a 6,6 foram considerados fortemente orientados para a APS. Resultados: Dos 804 idosos contatados, 784 foram incluídos nesta análise, destes: 526 (67,1%) eram mulheres, 258 eram homens (32,9%), a média de idade foi de 69,7 (±7,3) anos e a média de anos de estudo foi de 6,0 (±3,8). Referiram acessar serviço de atenção primária à saúde, 116 (45,8%) homens e 263 (50,1%) mulheres. O escore médio do PCATool para os homens foi de 5,47 (±1,3), e para as mulheres foi de 5,64 (±1,1), 18,6% dos serviços acessados por homens e 20,0% dos serviços acessados por mulheres tiveram orientação para APS. Conclusão: A média dos escores do PCATool de todos os serviços de saúde foi inferior ao valor que indica forte orientação à APS, e poucos serviços acessados pelos idosos apresentaram escore superior mínimo, sugerindo que há uma necessidade de fortalecimento da APS, por meio de operações em seus atributos.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Pesquisa e Ética da Faculdade de Odontologia da UFRGS no dia 18/06/2009, ata nº 05/09, com o número do processo 15297. O mesmo foi financiado com recurso concedido pelo Edital FAPERGS 002/2009 - PPSUS 2008/2009 (Processo 09/0131-6).