



www.cardiol.br

www.arquivosonline.com.br

Arquivos Brasileiros de Cardiologia

Sociedade Brasileira de Cardiologia • ISSN-0066-782X • Volume 109, Nº 4, Supl. 1, Outubro, 2017

RESUMO DAS COMUNICAÇÕES

SOCERGS 2017 CONGRESSO DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GRAMADO - RS

50042

Diagnósticos de Enfermagem em pacientes com doença arterial coronariana estável

PATRÍCIA CRISTINA CARDOSO, LARISSA GUSSATSCHENKO CABALLERO, KAREN RUSCHEL, MARIA ANTONIETA P. DE MOARES e ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA.

HCPA, Porto Alegre, RS, BRASIL.

Fundamento: A multiplicidade de fatores que influenciam as condições de saúde dos indivíduos com doença arterial coronariana justifica uma prática assistencial ampliada e eficaz para atender as demandas destes pacientes (Brasil, 2013). A sistematização do cuidado tem se mostrado um método científico que favorece o julgamento clínico do enfermeiro. Essa necessidade justifica-se pelo potencial favorecimento da aplicação do Diagnóstico de Enfermagem (DE) na prática clínica. **Objetivo:** Identificar os DE a partir de sinais e sintomas (características definidoras), pistas ou evidências clínicas dos pacientes acometidos de Cardiopatia Isquêmica estáveis em acompanhamento ambulatorial, de acordo com a NANDA-I. **Amostra:** Foram incluídos os 50 pacientes em acompanhamento no ambulatório de cardiopatia isquêmica de um Hospital Universitário de Porto Alegre, sem exclusões devido a registro inadequado. **Delineamento e Métodos:** Estudo transversal retrospectivo, com dados de prontuário eletrônico de abril de 2014 a dezembro de 2015 relativos ao primeiro atendimento no referido ambulatório. A partir dos dados coletados, treze DE foram propostos pelos pesquisadores e submetidos para validação de 17 especialistas em Cardiologia. Esta pesquisa foi submetida à apreciação ética (CAAE 49173015.4.0000.5327). **Resultados:** A partir da análise de prontuários de 50 pacientes ambulatoriais foram identificados treze DE: Controle ineficaz da saúde, Falta de adesão, Estilo de vida sedentário, Intolerância à atividade, Débito cardíaco diminuído, Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, Dor aguda, Manutenção ineficaz da saúde, Comportamento de saúde propenso a risco, Risco de débito cardíaco diminuído, Risco de intolerância à atividade, Padrão respiratório ineficaz e Memória prejudicada. Deste conjunto, quatro foram validados com 100% de consenso pelos enfermeiros especialistas: Intolerância à atividade, Controle ineficaz da saúde, Falta de adesão e Estilo de vida sedentário. **Conclusão:** A análise dos DE consensuados irá instrumentalizar os enfermeiros para uma avaliação mais acurada dos diagnósticos de Enfermagem para pacientes ambulatoriais com cardiopatia isquêmica, permitindo à equipe individualizar as metas e intervenções propostas para os pacientes a partir de diagnósticos validados nesta população.