

## ENURESE ESTÁ ASSOCIADA AO TRANSTORNO DE ANSIEDADE DE SEPARAÇÃO EM ESCOLARES DE UMA AMOSTRA COMUNITÁRIA COM ALTA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS ANSIOSOS

ESTÁCIO AMARO DA SILVA JÚNIOR; LUCIANO RASSIER ISOLAN; ANDRÉA GOYA TOCCHETTO; ELZA G.M. SPERB; CAMILA MORELATTO; STEFANIA PIGATTO TECHE; JANDIRA ACOSTA; GIOVANNI ABRAHÃO SALUM JR; GISELE GUS MANFRO

**Introdução:** Existe déficit de estudos sobre a possível correlação de transtornos de excreção com sintomas ansiosos. **Objetivo:** Avaliar se existe associação entre transtornos de excreção e transtornos de ansiedade em escolares. **Método:** Crianças foram investigadas com a Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders – versão infantil (SCARED-C). As crianças com percentil >75 (p75) e aproximadamente 10% dos demais estratos desta escala (p0-p25, p26-p50, p51-p75), escolhidos aleatoriamente, foram encaminhados para avaliação diagnóstica com psiquiatras treinados na versão brasileira do Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged-Children (K-SADS-PL), utilizado para estabelecer os diagnósticos de enurese e encoprese e de transtornos de ansiedade na infância e adolescência. A análise estatística foi realizada através do teste exato de Fisher e teste t de Student, considerando um  $\alpha=0,05$ , bi-caudal e IC95%. **Resultados:** Dos 144 pacientes avaliados pelo K-SADS-PL apenas 9 (6,3%) apresentaram transtornos de excreção ao longo da vida, sendo que os 9 (6,3%) apresentaram enurese e apenas 1 (0,7%) apresentou encoprese. Transtorno de ansiedade de separação ao longo da vida associou-se estatisticamente ao diagnóstico de enurese (OR=5,46; IC95% 1,3 a 22,4;  $p=0,028$ ). Nenhum outro transtorno de ansiedade associou-se àqueles. Pode-se observar uma tendência na comparação da sub-escala de ansiedade de separação da SCARED-C entre os pacientes sem e com história de enurese na vida respectivamente ( $6,6\pm 3,0$  vs.  $8,6\pm 4,0$ ;  $p=0,059$ ). **Conclusão:** Embora os resultados sejam limitados por uma pequena prevalência de enurese na amostra, pode-se observar que parece haver uma associação entre enurese e transtorno de ansiedade de separação em escolares.