O momento da enxertia em citros é determinado pelo diâmetro do caule dos porta-enxertos. Quanto antes atingem o diâmetro de 0,8 a 1,0 cm da haste a 15 cm de altura do solo, antes pode ser realizada a enxertia por borbulhia. Em determinadas condições, o desponte dos porta-enxertos, que consiste da poda da parte aérea a 30 cm de altura, é considerado um método que permite incrementar o diâmetro da haste, comparativamente a plantas não despontadas, porém sem comprovação científica. Diante disso, este trabalho busca analisar a resposta de porta-enxertos de citros ao desponte realizado no terço superior da haste, avaliando a velocidade de incremento do diâmetro destas comparativamente a plantas não despontadas, visando reduzir o tempo transcorrido desde a semeadura até a enxertia. O experimento foi instalado no dia 3/4/2009, testando-se o desponte a 30 cm de altura em cinco cultivares de porta-enxertos de citros: Citrumeleiro 'Swingle', Poncirus 'Trifoliata' e os Citranges 'Troyer', 'C37' e 'C13'. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com três repetições e oito plantas por parcela. Avaliou-se semanalmente a altura e o diâmetro das plantas. Verificou-se que as plantas despontadas, transcorridos 63 dias do desponte, apresentaram menor incremento do diâmetro do caule, comparativamente às plantas não despontadas, demonstrando a ineficiência da prática de desponte. Entre as cultivares há diferença em vigor. Na ordem decrescente de altura estão as cultivares Citrange 'Troyer', Citrange 'C37', Citrumeleiro 'Swingle', Poncirus 'Trifoliata' e Citrange 'C13'. Já no caso do diâmetro, a ordem decrescente de vigor é Citrumeleiro 'Swingle', Citrange 'C37', Citrange 'Troyer', Citrange 'C13' e Poncirus 'Trifoliata', quando não despontadas. No caso do desponte, o Citrange 'Troyer' passa a ser o mais vigoroso, não ocorrendo alteração significativa entre os demais.