

456

DINÂMICA POPULACIONAL DO GÊNERO *EUPTYCHIA* (*CYSSIA*), NYMPHALIDAE, LEPIDOPTERA, NA RESERVA BIOLÓGICA DO LAMI, PORTO ALEGRE. *Teo Pereira Halfen, Aldo Mellender de Araújo* (Departamento de Genética - Instituto de Biociências - UFRGS)

Através do método captura-marcação-recaptura, borboletas do gênero *Euptychia* (*Cyssia*) foram monitoradas semanalmente em trilhas da Reserva Biológica do Lami, a fim de avaliar a capacidade de dispersão de tal gênero, relacionando também os desenhos de suas asas com possíveis morfotipos característicos de determinados locais das trilhas. Resultados preliminares indicam um índice de recaptura em torno de 10%. Em aproximadamente 90% dos casos, tratam-se de borboletas marcadas uma semana anterior à recaptura, sendo as restantes resultado de marcação duas semanas anteriores a esta. Quase todas borboletas recapturadas foram encontradas até 100m dos seus locais de marcação, o que indicaria uma dispersão relativamente baixa destas borboletas. Este estudo também visa verificar flutuações intra e interanuais na abundância populacional de tal gênero e correlacioná-las ou não à frequência de visitantes na Reserva (BIC-PROPESQ/UFRGS).