

482 INCIDÊNCIA DE MASTOPATIAS EM MAMAS SUBMETIDAS À CIRURGIA ESTÉTICA. C.H.Menke, J.V.Biazus, J.A.Cavalheiro, A.A.Canals*, E.S.Dias*. (Setor de Patologia Mamária, Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HCPA).

Com o objetivo de avaliar a incidência de Mastopatias em pacientes submetidas à Cir.Estética no HCPA, foram analisados retrospectivamente os prontuários de 139pacientes submetidas à Mamoplastia Redutora no período de 1980 a 1990. Os dados coletados referiram-se a idade,mamografia prévia,motivo da cirurgia e achados anátomo-patológico(AP). A idade média foi de 31 anos(DP= 12,20). Mamografia prévia foi realizada em 9(6,4%). O principal motivo de cirurgia foi o aumento do volume mamário bilateral(76,9%). Dos materiais que foram enviados para exame AP observamos 50 resultados diferentes,os quais agrupamos nas classes:-sem anormalidade(44casos),-alterações fibrocísticas(48casos),-ectasia(3casos),-papilomatose(1caso)e-carcinoma(3casos). As 3 pacientes que apresentaram Ca não realizaram mamografia prévia. Tendo em vista os resultados apresentados e o aumento da incidência de Ca na população em geral, e em mulheres com menos de 35 anos, concluímos:I)a importância da mamografia ou ecografia em toda candidata à cir.estética mama;II)envio do material para-exame AP é obrigatório quando acima 20anos.(PROPESP/FAPERGS