

368

CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS DOS CASOS DE ESPOROTRICOSE DIAGNOSTICADOS NO SERVIÇO DE DERMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - UFRGS. *Rodrigo Vettorato, Jorge Zanol, Maria Lucia**Scroferneker (orient.) (UFRGS).*

Introdução: A esporotricose é uma infecção subaguda ou crônica causada pelo fungo dimórfico *Sporothrix schenckii*, apresentando-se como lesões nodulares do tecido cutâneo ou subcutâneo e linfáticos adjacentes. As características clínicas e histopatológicas dos casos de esporotricose diagnosticados e tratados no serviço de Dermatologia da UFRGS - Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia foram estudadas retrospectivamente. **Materiais e métodos:** Prontuários médicos e cortes histológicos dos últimos 35 anos foram revisados e analisados estatisticamente com auxílio do programa Epi Info 6.04b. As lâminas contendo material de biópsia foram submetidas a coloração de H.E. e Grocott. **Resultados:** Trezentos e quatro casos de esporotricose foram confirmados por exame micológico. Apenas 60 blocos contendo material de biópsia foram localizados. Observou-se associação estatisticamente não significativa entre a presença de fungos e o grau de hiperplasia epidérmica, bem como tendência a exsudação dérmica acentuada nos cortes analisados. Não houve diferença quanto à presença de granulomas entre as lâminas contendo ou não células fúngicas. **Conclusão:** O tamanho reduzido da amostra (60) limita as análises estatísticas, impedindo conclusões representativas da população estudada (304). (Fapergs).