

415

**DEPRESSÃO EM HOSPITAL GERAL: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE ESCALAS DE RASTREAMENTO.** *Paloma P. Mazzochi, Adriana Fabian, Aruza Quintana, Natália Soles, Patrícia Gammerman, Patrícia Paludo, Sérgio P. Machado, José R. Goldim, Marcelo Fleck, Cláudio L. Eizirik.*

(Departamento de Psiquiatria-Faculdade de Medicina-UFRGS).

Há uma alta prevalência de depressão entre pacientes de serviços não-psiquiátricos, tanto ambulatoriais como hospitalares. Em nosso meio, a depressão tem alta prevalência em pacientes adultos de especialidades clínicas e cirúrgicas de Hospital Geral Universitário. O objetivo desta pesquisa foi comparar diferentes escalas de detecção de depressão em Hospital Geral. Foram entrevistados 305 pacientes internados em unidades clínicas e cirúrgicas do HCPA, nas primeiras 48 horas de admissão. A seleção foi por amostra aleatória simples. Foram usados instrumentos já validados para o português: Beck Depression Inventory – BDI (ponto de corte de 16), Hospital Anxiety and Depression – HAD (ponto de corte de 9), Centre for Epidemiological Studies-Depression – CES-D (ponto de corte de 17) e Prime-MD módulo de humor, este escolhido como referência. Os dados foram inseridos na base de dados Excel e analisados com o programa SPSS usando concordância de escore Kappa, teste qui-quadrado e correlação de Pearson. Usou-se o nível de significância de 5%. A sensibilidade e especificidade também foram calculadas. Os resultados obtidos foram de 27,5% de depressão para HAD, 23,3% para BDI, 20% para CES-D e 39,7 para PRIME-MD. O teste mais sensível foi o HAD (49,6%) e o mais específico foi o CES-D (93,5%). A escala CES-D versus BDI teve um valor Kappa de 0,57 e a correlação de 0,67. A escala CES-D versus HAD teve um valor Kappa de 0,30 e uma correlação de 0,56. Finalmente, HAD versus BDI um valor Kappa de 0,49 e uma correlação de 0,70. Evidenciamos uma pobre correlação Kappa e de convergência entre as escalas. Esses achados podem sugerir que as diferentes escalas medem, de fato, diferentes aspectos, o que pode ser atribuído parcialmente à falta de um constructo adequado para a definição de depressão. (Fapergs-UFRGS).