
Título: *FATORES DE INSUCESSO NO ABANDONO DO TABAGISMO*

Área Temática: SAÚDE

Modalidade: SALÃO DE EXTENSÃO - COMUNICAÇÃO ORAL E PÔSTERES

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Palavras-chave: Tabagismo; Abandono do hábito de fumar; Comportamento de redução de risco; Dependência à nicotina

Equipe:

| NOME | PARTICIPAÇÃO |
|---------------------------------|-------------------------|
| SERGIO SALDANHA MENNA BARRETO | Autores para Publicação |
| ISABEL CRISTINA ECHER | Coordenador(a) Geral |
| RAFAELA MARTINS POTTES DE MELLO | Painelista |

Contato: ISABEL CRISTINA ECHER
 Telefone: (51)32234699
 E-mail: isabel.echer@terra.com.br

Síntese do Projeto:

O estudo aborda as dificuldades inerentes ao processo de abandono do tabagismo e esta vinculado ao projeto de extensão "Assessoria na elaboração de pesquisa em saúde junto a profissionais do HCPA." Tem o objetivo de identificar estratégias que impulsionem o abandono do tabagismo.

Resumo:

Introdução: Entre os diversos fatores dificultadores da cessação, destacam-se aqueles ligados às características próprias do indivíduo, tais como: gravidade da síndrome de abstinência, grau de dependência nicotínica, personalidade e as doenças psiquiátricas e o ganho de peso. **Objetivo:** Avaliar os fatores de insucesso no abandono do tabagismo. **Método:** Estudo qualitativo, no qual foram entrevistados dez indivíduos de Porto Alegre que pararam de fumar há mais de seis meses, com dependência média, elevada e muito elevada pela escala de Fagerström. As informações foram examinadas por Análise de Conteúdo proposta por Bardin. O método consiste em analisar as entrevistas por meio das etapas de pré-análise, exploração do material e a categorização das informações. **Resultados e discussão:** O insucesso no abandono do tabagismo, no grupo estudado, foi conseqüência de um conjunto de fatores, como: dependência química e psicológica, inverdade, frustração de não conseguir ficar sem o cigarro, aumento de peso, desrespeito, depressão, vulnerabilidade do ex-fumante, oscilações de humor, falta de apoio e a não aceitação dos malefícios. **Considerações finais:** Os resultados alertam para a necessidade de preparo das equipes de saúde e a disponibilidade de programas efetivos de cessação do tabagismo e o acesso a medicamentos. Evidenciam que o tabagismo precisa ser encarado como uma doença crônica que representa um problema de alta relevância para a saúde pública mundial. Acreditamos que agregar estes resultados aos métodos atualmente utilizados no apoio a cessação do tabagismo pode ser uma estratégia interessante.

Lista de Ações