

SALÃO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
XXIX SIC
UFRGS
PROPESQ



múltipla 
UNIVERSIDADE
inovadora  inspiradora

Evento	Salão UFRGS 2017: SIC - XXIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2017
Local	Campus do Vale
Título	Distribuição da tuberculose em idosos no estado do Rio Grande do Sul entre 2001 a 2015
Autor	TIAGO VARGAS BELKE
Orientador	CAMILA MELLO DOS SANTOS

BELKE, Tiago; SANTOS, Camila Mello dos. **Distribuição da tuberculose em idosos no estado do Rio Grande do Sul entre 2001 a 2015.** Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A tuberculose (TB) permanece como um dos principais problemas de saúde. Deixou de ser a segunda causa de óbito por doença infecciosa no mundo em 2013 e passou a ser a principal causa de óbito por doença infecciosa em 2014. De acordo com dados sobre o envelhecimento, os idosos constituem 11,5% da população global. A TB no idoso é um problema de saúde pública emergente em virtude de seu rápido crescimento populacional e em função da patologia possuir fatores que favorecem a sua gravidade. O objetivo do presente estudo foi descrever a distribuição da tuberculose em idosos no estado do Rio Grande do Sul entre 2001 a 2015. Trata-se de um estudo descritivo, com utilização de dados secundários. A amostra do estudo foi composta por idosos diagnosticados com TB a partir do ano de 2001 a 2015, residentes no Rio Grande do Sul. Foram considerados a totalidade dos casos de TB, bem como todas as formas de TB. As variáveis incluídas no estudo foram sexo e idade. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informações de Agravos de Notificação e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As variáveis foram categorizadas de acordo com o sexo (masculino ou feminino). As análises foram estratificadas por faixa etária (60 - 69 anos / 70 - 79 anos / 80 anos ou mais). Os dados foram descritos em forma de frequência absoluta e relativa. Os resultados foram computados através do software Microsoft Excel. Foram identificados 9.634 casos de TB entre a população idosa, dos quais 65,8% foram casos nos indivíduos do sexo masculino. A distribuição etária dos casos apontou para a sua concentração entre os homens idosos na faixa etária mais jovem (60-69 anos). Fato oposto aconteceu com o percentual de idosas com TB; as mulheres entre 60 a 69 anos representaram 31,% dos casos, aumentando para 35,7% na faixa de 70 a 79 e na faixa de 80 anos ou mais totalizaram 44,6%. Os resultados confirmam desigualdades na distribuição da TB entre os idosos. A tuberculose no idoso é um problema de saúde coletiva em virtude de seu rápido crescimento nesta faixa etária e com impacto direto no delineamento de novas estratégias de controle da doença entre os idosos.